



お腹がいたいとき

症状の相談や、夜間・休日に受診できる医療機関の案内
ふなばし健康ダイヤル 24 (40ページ参照) ☎ 0120-2784-37

熱、吐き気、便秘、下痢がないか、よく観察しましょう。
お腹を抱えこむように痛がらないか、お腹が張っていない
かも見てください。

赤ちゃんがわけもなく繰り返し泣くときは、お腹が痛い可
能性があります。また、排便で治ることもあります。

我慢できる痛みになり、全身状態が良ければ、通常の診療
時間内に受診しましょう。

ただし、症状が大きく変わった場合は医療機関を受診してください。

こんなときは、医療機関を受診しましょう。

☐ ぐったりして泣いてばかりいる。

☐ また 股の付け根がは腫れている。

☐ 赤ちゃんが足をちぢめて激しく泣いたり、間隔をおいて発作的
に激しく泣く。

☐ ウンチに血が混じっている。

☐ お腹がパンパンに張っている。

☐ お腹をかかめて痛がる。

☐ お腹を触ると痛がる。

☐ お腹が痛くて歩けない。

☐ ジャンプ、ケンケンなど飛び跳ねるとお腹を痛がり、繰り返せない。

☐ 下痢、おう吐を伴っている。



ワンポイントアドバイス



3歳以下の子どもは受診前に下剤やかんちょう浣腸を使わない
ようにしましょう。



痛がり方の様子、息のにおいを観察しましょう。



腹痛が軽いときは、無理に食べさせないで水分を少し
ずつ与え、様子を見ましょう。



排便で治ることもありますので、トイレも促しまし
ょう。