

Ⅱ. 事故編



頭を打ったとき

吐き気やおう吐の有無、瞳の大きさ、目や手足の動きに注意し、頭を打った後にすぐ泣いたり、意識がはっきりしているときは、様子を見て通常の診療時間内に受診しましょう。

ただし、症状が大きく変わった場合は医療機関を受診してください。

こんなときは、医療機関を受診しましょう。

- ☐ 吐く。
- ☐ 耳や鼻からの出血がある。
- ☐ 泣かない。
- ☐ ぼんやりしている。
- ☐ 左右の瞳の大きさが違う。
- ☐ 頭を打った前後の記憶がない。
- ☐ 頭を打ったところにくぼみがある。
- ☐ 体温が上昇した。
- ☐ 言葉が不明瞭である。

症状の相談や、夜間・休日に受診できる医療機関の案内
ふなばし健康ダイヤル 24 (40ページ参照) ☎ 0120-2784-37

こんなときは、救急車を呼びましょう。

- ☐ 意識がない。
- ☐ ぐったりしている。
- ☐ けいれんを起こしている。



ワンポイントアドバイス



こぶは20分くらいタオルの上から氷のうなどで冷やして様子を見ましょう。



出血がある場合は、清潔なガーゼなどで上から圧迫しましょう。